

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ, СРОКЕ СЛУЖБЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ СЛУЖБЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

№ пп	Результат оказания услуг, выполнения работ	Правила и условия эффективного и безопасного использования	Установленный срок службы на результат	Необходимые действия по истечении срока службы	Возможные последствия невыполнения действий по истечении срока службы
1	Коронка для восстановления зуба	Ограничение потребления продуктов с большим содержанием красящих пигментов; ограничение потребления слишком холодных или слишком горячих продуктов; ограничение чрезмерных нагрузок; ограничение потребления вязких и тягучих продуктов. Выполнение графика контрольных осмотров, рекомендованных врачом, а также других рекомендаций врача по сохранению результатов проведённого лечения.	10 лет	Замена коронки	Невозможность использования коронки по назначению, ее разрушение и причинение вреда жизни и здоровью.
2	Пломбы и реставрации	При уходе за зубами с пломбами обязательно использование средств гигиены, рекомендованных врачом –	10 лет	Замена пломбы	Разрушение пломбы и необходимость своевременного лечения и замены пломбы.

		стоматологом; выполнение графика контрольных осмотров, рекомендованных врачом, а также других рекомендаций врача по сохранению результатов проведённого лечения.			
3	Снятие зубных отложений	Соблюдение правил гигиены; выполнение графика контрольных осмотров, рекомендованных врачом, а также других рекомендаций врача по сохранению результатов проведённого лечения.	6 месяцев	Кровоточивость десен; Возникновение кариеса.	Кровоточивость десен, который способствует образованию зубодесневого кармана, где будут скапливаться остатки пищи, вызывая воспалительные процессы в десне.
4	Зубной протез	В течение первых двух недель необходимо принимать лишь мягкую пищу, нагружая челюсть равномерно. Нужно избегать приема очень жесткой пищи (сухари, орехи, целое яблоко). После еды необходимо полоскать рот, сняв протез. Выполнение графика контрольных осмотров, рекомендованных врачом, а также других рекомендаций врача по сохранению результатов проведённого лечения.	5-10 лет	Убыль кости.	Невозможность использования зубного протеза по назначению, ее разрушение и причинение вреда жизни и здоровью.
5	Имплантат	Качественный гигиенический уход; Выполнение графика контрольных осмотров, рекомендованных врачом, а также других рекомендаций врача по сохранению результатов проведённого лечения.	Пожизненный срок службы	Замена имплантов или их экстренное удаление требуется лишь при появлении серьезных симптомов или выявлении у пациента сложных заболеваний. При этом такие проблемы	Выкручивание импланта и необходимость в процедуре повторной имплантации.

				<p>могут возникнуть спустя 10 или даже 20 лет после установки и успешного использования искусственных зубов. Если у пациента не наблюдается никаких жалоб, осложнений и дискомфорта при ношении, необходимости в замене нет.</p>	
--	--	--	--	--	--